

## 包茎手術を受けられる方へ(説明・同意書)

手術日：           年           月           日

### 【手術に当たって】

健康保険の適応にならない仮性包茎に対して、当院では自費での包茎手術を行っています。

受診にあたっては、羞恥心、恐怖心を感じられたことと存じます。

そのような患者様の気持ちに応えるべく、我々も全力で、可能な限り丁寧・安全に手術を行います。

しかし、全ての手術にはリスクが伴います。傷跡が残る場合や、思ったような形にならない場合もあります。

通常、傷が消えるのに1カ月程度、感覚が馴染むのには3か月程度要します。

必ず下記の注意事項を熟読いただき、ご納得いただける場合にのみ、手術を行います。

手術前・後いつでも、心配なことがあればご相談に応じます。

### 【料金】

10万円(税込)

手術前検査、診察、薬品代など全て含みます。

追加費用はかかりませんが、合併症に伴う追加治療に対して実費をいただく場合があります。

### 【手術方法】

時間は30分～60分です。

原則、日帰り手術です。

麻酔は麻酔シール、局所麻酔で行います。

局所麻酔はかなり細い針を使用しますが、最初に刺すときは痛みがあります。


手術中に痛みがあることは殆どありませんが、触られている感覚はあります。

痛みがあれば遠慮なくおっしゃってください。

下の図のように、環状切除術を行います。

※癒着がかなり強い、あるいは通常の形態と著しく異なる場合、環状切除できないことがあります。その際は、切開のみ行い、後日浮腫が引いた後に改めて環状切除を行います。

この場合は再度料金が発生します。



余っている包皮を、一周、带状に薄く切除し、上下で縫い合わせます。

縫合には溶ける糸を使用します。

切る位置は亀頭直下の5~7mm程度下になります。

亀頭直下で切ると、傷跡が突っ張り、機能障害が起こりやすくなりますのでお勧めしませんが、ご希望であれば亀頭直下の切開でも可能です。

切る皮の量は個人差がありますが、突っ張りすぎない程度で行います。

包皮小帯(いわゆる裏筋)は温存します。

### 【合併症】

・痛み：ほぼ全例に起こります。軽度の痛みが2-3日続きます。痛み止めを処方していますが、実際に痛くて内服される方は全体の5割程度です。

・浮腫：術後1週間程度、むくみがあります。これはほとんどの場合一時的です。血腫(血の塊)が原因でむくんでいる場合、再手術が必要になる場合があります(100人に1人程度)。

・出血：軽い出血があります。にじむ程度で、だらだら出続けていなければ、様子を見て大丈夫です。

・感染症：かなり稀ですが、発熱、膿などがあれば抗生剤の投与、再手術を行います。

・ケロイド：稀ながら体質的に、手術跡が盛り上がってしまう方がいます。ご希望があれば再手術しますが、その場合は再度料金がかかります。

・勃起不全、感覚障害：かなり稀ですが、神経を損傷して勃起不全、感覚障害が起こることがあります。いずれも時間経過とともに改善する場合があります。

## 【手術までの流れ】

### 〈初診時〉

手術について医師より説明します。

簡単な診察の後、血液検査を行い、感染症、基礎疾患が無いかチェックします。

### 〈手術前日〉

手術までは可能な限り健康管理に努めてください。

前日は飲酒、喫煙を控えてください。

内服薬中止は、別途指示に従ってください。

### 〈手術当日〉

来院前に入浴し、陰毛を全て剃毛してください。

※手術後、48時間シャワー不可です。

来院、帰宅時は自家用車の運転を避けてください。

食事は手術開始時刻の4時間前、飲水は2時間前までとします。

手術時刻の30分前までに来院してください。

来院後、手術着に着替え、麻酔シールを貼ります。

点滴をとり、手術室に入室します。

手術時間は30-60分程度です。

手術終了後、問題なければすぐに帰宅できます。

### 〈手術後〉

手術はガーゼを巻いた状態で終了します。

手術後、30分程度休憩いただき、問題なく歩行できれば帰宅可能です。

歩行、事務作業、飲食は手術直後からこれまで通り可能です。

シャワー、風呂→翌日診察以降

走る、自転車などの軽い運動、アルコール、喫煙→1週間後から。無理のない範囲で

性行為(自慰行為を含む)、激しい運動→1週間後の診察でお伝えします。通常は2~4週間後からになります。

手術翌日に診察にお越しください。

翌日診察以降、ご自身でシャワー後の軟膏、ガーゼ交換をしていただきます(説明いたします)。

1週間後、1か月後と合計3回診察にお越しください。

どうしても受診が難しい場合はご相談ください。

痛み止めを処方していますが、足りない場合はおっしゃってください。  
通常は2-3日分の痛み止めです。追加処方の場合は実費がかかります。

溶ける糸を使用しているので抜糸は不要ですが、人によっては糸が4週間程度残ります。  
気になる場合は抜糸できますのでおっしゃってください。

#### 同意書

丹後中央病院 殿

以上の説明をよく読み、起こり得る合併症についても理解しました。  
上記表記内容の手術を受けることに同意します。

担当医師： 泌尿器科

20 年 月 日

本人名前：

住所：

電話：